

E fach ihn das ♀ also ganz in ein eng glas, wegen
der langsamem gradation, den die Substanz es auf
gelöst wird, je besser und reicher ~~ist~~^{starken} ich das O
befindet in einer proba, so ihs mehr in sein glas
gethan habe, so giess ich et auf ein Ⓛ, das über
das ♀ zu finger hoch steht, lasst es also solviren
von sich selbst, und nicht unter Δ, dann ich
noch ein ♀ schwerer Rose eisen gethan, et halben
das es sich in sich selbstten erhitzen unrichte und
lasse es also solviren 3 tag nach ein entz 4/5 weg,
man muß ab zu vor et nach diesen dreyen
tagen, dieses ♀ ~~haben~~ haben, welches also zuge-
richtet werden muß; man muß nun
eine punte Ⓛ in ein fein geramm glas, und
darin des zypriten Ⓛ & 3 lotz, das fixen & das
vorn ~~zerten~~ Ⓛ (doch nicht solvire) und 3 lotz
wan diese 3 lotz solviret seyn. Auch ♀ lotz
von diesem Ⓛ also mit den scinen ~~haben~~ zu
gericht geust man nach dreyen tagen unger-
fehr in das glas et inen ♀ solviret & habet es
am alball zu braufen und zu solviren, last
es 60 stunden &c.

84 Es ist ein schlechter wein Ⓛ, et ein gut man
3 lotz des vorigen schwärzen Δ, so halt er in
+ Ⓛ somgt so läßt er sic auf in ein trocken
röthe, doch nicht gär, so nehme ich et zu ein
wenig Ⓛ, das löß ihn vollends auf in colon
ruthen und schöner